

## Эффективность и переносимость терапии перициaziном больных шизотипическим расстройством, органическим расстройством личности и пациентов с патохарактерологическими нарушениями в рамках расстройств личности

Д.С. ДАНИЛОВ

Клиника психиатрии им. С.С. Корсакова, ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)», Москва, Россия

**Цель исследования.** Оценка эффективности и переносимости терапии перициaziном у больных психическими заболеваниями, проявляющимися психопатоподобной симптоматикой, и при коррекции патохарактерологических нарушений у пациентов с расстройствами личности в периоды краткосрочной стационарной и длительной амбулаторной терапии. **Материал и методы.** Проведено обследование 63 пациентов с шизотипическим расстройством и органическим расстройством личности, состояние которых определялось психопатоподобной симптоматикой, и пациентов с патохарактерологическими нарушениями в рамках диссоциального расстройства личности и импульсивного типа эмоционально неустойчивого расстройства личности. Терапия перициaziном проводилась в периоды краткосрочного стационарного (6 нед) и длительного амбулаторного (6 мес) наблюдений. Оценивались эффективность и переносимость лечения, а также качество терапевтического сотрудничества (комплаенс). **Результаты и заключение.** Терапия перициaziном была эффективна у всех больных. Быстрее улучшалось состояние пациентов с органическим расстройством личности и пациентов с расстройствами личности (психопатиями). Максимальное улучшение психического состояния достигалось на этапе стационарного лечения, и в дальнейшем на этапе амбулаторной терапии оно не менялось. Улучшение психического состояния больных шизотипическим расстройством также достигалось на этапе стационарной терапии и продолжалось на этапе длительного амбулаторного лечения (при условии приема перициазина). Побочные эффекты терапии перициaziном ограничивались развитием экстрапирамидной симптоматики; частота развития метаболического синдрома при терапии перициaziном была низкой. На амбулаторном этапе исследования качество терапевтического сотрудничества было выше при продолжении наблюдения пациентов врачами, лечившими их ранее на этапе стационарной терапии.

**Ключевые слова:** перициазин, эффективность, переносимость, терапевтическое сотрудничество (комплаенс), психопатоподобная симптоматика, патохарактерологические нарушения, шизотипическое расстройство, органическое расстройство личности, диссоциальное расстройство личности, импульсивный тип эмоционально неустойчивого расстройства личности.

## The efficacy and tolerability of pericyazine in the treatment of patients with schizotypal disorder, organic personality disorders and pathocharacterological changes within personality disorders

D.S. DANILOV

Korsakov Clinic of Psychiatry, Sechenov First Moscow State Medical University, Ministry of Health of Russia, Moscow, Russia

**Objective.** To assess the efficacy and tolerability of pericyazine in the treatment of patients with mental disorders manifesting with psychopathic-like symptoms and correction of pathocharacterological disorders in patients with personality disorders during the short-term admission to the hospital or the long-term outpatient treatment. **Material and methods.** Sixty-three patients with schizotypal personality disorder and organic personality disorder with psychopathic-like symptoms and pathocharacterological changes within the diagnosis of dissocial personality disorder and borderline personality disorder were examined. Patients received pericyazine during the short-term admission to the hospital (6 weeks) or the long-term outpatient treatment (6 month). Efficacy, tolerability and compliance were assessed in the study. **Results and conclusion.** Treatment with pericyazine was effective in all patients. The improvement was seen in patients with organic personality disorders and patients with personality disorders (psychopathy). The maximal effect was observed in inpatients and this effect remained during outpatient treatment. The improvement of mental state of patients with schizotypal personality disorder achieved during inpatient treatment with pericyazine continued during the long-term outpatient treatment. Side-effects were restricted to extrapyramidal symptoms, the frequency of metabolic syndrome was low. During outpatient treatment, the compliance was higher if the patient was managed by the same psychiatrist during inpatient- and outpatient treatment.

**Keywords:** pericyazine, efficacy, tolerability, compliance, psychopathic-like symptoms, pathocharacterological disorders, schizotypal disorder, personality disorder, dissocial disorder, impulsive type of emotional unstable personality disorder.